



MANUAL DO SCIH



POP SCIH nº. 09

Indicações para precauções de isolamento

Elaborado em: JAN / 2009

Revisado em:

Objetivo:

- Visam direcionar adequadamente o tipo de precaução de isolamento a ser utilizada de acordo com o modo de transmissão

Tipo de precaução	Condição Clínica	Possibilidade diagnóstica
-------------------	------------------	---------------------------

Precauções para Aerossóis	<ul style="list-style-type: none"> • Exantema Vesicular, • Exantema maculopapular com febre e coriza, • Tosse, febre, infiltrado pulmonar em paciente HIV+ 	Varicela, Zoster disseminado, Rubéola, Sarampo Tuberculose
Precauções Para Gotículas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningite, • Petéquias e febre, • Tosse persistente paroxística ou severa durante períodos de ocorrência de coqueluche 	Doença Meningocócica Doença Meningocócica Coqueluche
Precauções De contato	<ul style="list-style-type: none"> • Diarréia aguda infecciosa em paciente incontinente ou em fralda, • Diarréia em adulto com história de uso recente de antimicrobiano, • Exantema vesicular, • Bronquiolite em lactentes e crianças jovens, • História de colonização ou infecção por bactéria multi-R, • Internação recente em hospital com alta prevalência de bactérias multi-R • Abscessos ou feridas com drenagem de secreção não contida pelo curativo 	Vírus/bactérias entéricas Clostridium difficile Varicela, Zoster disseminado VRS ou Vírus Parainfluenza Bactéria multi-R Bactéria multi-R Staphylococcus/Streptococcus

Referências:

Manual CCIH – USP 2005

Aprovação: