

XVIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFJF

Grande área:

Ciências da Saúde

Projeto:

TRATAMENTO ESTATÍSTICO NA ABORDAGEM TIPOLOGICA DO BANCO DE DADOS DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ALCOOLISTAS E/OU DEPENDENTES DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Autores:

RAFAEL AUGUSTO FERREIRA (XX PIBIC 2011/2012)

CAMILA TAMARA FERREIRA (XX PIBIC 2011/2012)

CAMILA TAMARA FERREIRA (VIII PROVOQUE)

LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO (CO-ORIENTADOR)

MARIO SERGIO RIBEIRO (ORIENTADOR)

Resumo:

A classificação binária de Babor é uma das principais tipologias de alcoolismo e tem sido avaliada por diversos pesquisadores que, todavia, ainda não chegaram a resultados consistentes quanto a sua utilidade clínica e epidemiológica. O objetivo deste estudo foi avaliar a tipologia de Babor e a Concordância Diagnóstica entre esta Tipologia e a tipologia desenvolvida previamente pelo LAPPDA numa amostra de 273 alcoolistas. Após a adequação das variáveis, executou-se Análise de Cluster, Bivariada e de Concordância Diagnóstica. Identificou-se 2 subgrupos constituídos por 177 e 96 pacientes. Esta replicação aproximada da Tipologia de Babor foi capaz de identificar dois subgrupos distintos, com características semelhantes aos subtipos A e B; além de se mostrarem menos estáveis nos socioeconômicos, os pacientes classificados como subgrupo 1 possuíam características de maior vulnerabilidade e severidade clínica, além de apresentarem melhor resposta terapêutica. Os dois subgrupos guardaram semelhanças e também diferenças identificáveis com os subgrupos da Tipologia Lappda. A Tipologia de Babor foi construída a partir de fatores não-modificáveis por tratamento, tornando seu valor propedêutico limitado; por outro lado, as características constitutivas da Tipologia do Lappda podem contribuir para uma mais efetiva aplicação terapêutica da ampla compreensão das diferentes dimensões - afetivos, cognitivos e comportamentais - que interatuam no desenvolvimento do alcoolismo.