

**Área:** Humanas.

**Título:** AVALIAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO USO DE RISCO DE ÁLCOOL EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA ZONA DA MATA MINEIRA

**Orientador:** TELMO MOTA RONZANI

**Autor:** DANIELA CRISTINA BELCHIOR MOTA,

**Resumo:**

O abuso de álcool está associado a uma grande variedade de problemas de saúde, sociais e legais. Assim, detectar precocemente o consumo abusivo de álcool é fundamental para prevenir conseqüências sociais e de saúde na população geral. Existem fortes evidências da eficácia das estratégias de triagem associada às intervenções breves para detectar e reduzir o consumo de álcool. Contudo, diversos estudos indicaram dificuldades para implementar a Triagem associada à Intervenções Breve (TIB) na Atenção Primária à Saúde (APS). Destaca-se que a APS seria um nível de atenção estratégico para a implementação da TIB, que pode ser utilizada para diminuição dos problemas associados ao álcool entre pacientes destes serviços. Esta pesquisa objetivou avaliar a efetividade da implementação de estratégias da TIB para a prevenção do uso de álcool em serviços de APS de três municípios de Minas Gerais. Participaram do estudo 113 profissionais de saúde que faziam parte das equipes da APS dos três municípios no período de março a dezembro de 2007. Os profissionais da APS participaram de uma capacitação para a prática da TIB, com carga horária de oito horas. No primeiro mês após a capacitação foram realizadas reuniões semanais com os profissionais de saúde, além de reuniões com os gestores, as quais tiveram a finalidade de acompanhar a implementação do projeto nos serviços de saúde. Posteriormente, as reuniões ocorreram mensalmente até que fosse realizada a avaliação de seguimento, que ocorreu seis meses após a capacitação. A avaliação qualitativa envolveu observação participante, entrevistas com os gestores na pré-capacitação e no seguimento, e grupos focais com profissionais de saúde no seguimento. A avaliação quantitativa realizou-se através dos instrumentos: Questionário de Conhecimento Objetivo (QCO), Escala de Moralização do Uso de Álcool (EMUA), Questionário de Modelo de Percepção do Uso de Álcool (QMPA) e Questionário de Práticas de Prevenção do Uso de Álcool (QPA). Os dados qualitativos foram analisados através da análise de conteúdo. Os instrumentos foram analisados através de estatísticas descritivas e inferenciais, obtendo-se uma comparação entre os municípios na pré-capacitação e no seguimento, e uma avaliação longitudinal em cada município. Os municípios apontaram que fatores como a participação dos gestores e a integração entre os profissionais de saúde para a prática da TIB estão associados à maior efetividade da implementação. Tais fatores ocorreram no município "A". A média de AUDIT aplicadas por profissional de saúde capacitado durante período de implementação foi significativamente superior no município A. Neste município houve uma diminuição significativa da EMUA e o QPA apresentou resultados superiores em comparação aos outros municípios. Nos outros municípios, os efeitos do processo de



XV  
Seminário de  
Iniciação  
Científica



ProPesq | Pró-Reitoria  
de Pesquisa

implementação do projeto indicaram um aumento no conhecimento dos profissionais de saúde em relação à prevenção do uso de álcool, demonstrado pelo QCO. Nestes municípios, houve uma mudança significativa no QPA, que não foi substancial para indicar uma implementação efetiva. Portanto, o engajamento dos gestores no processo de implementação das estratégias de prevenção ao uso de álcool está associado à maior efetividade da implementação de tais estratégias em serviços de APS.